

Solicitante: Procedimento: RM COLUNA LOMBAR Dr.(a), MOROUM MIGUEL ANDRAUS 24/11/2016 08:51:00 JULIO CEZAR BATISTA MENDES (Masculino 37)

Metodología: Exame realizado em equipamento de alto campo magnético (1,5 Tesla). Foram realizadas aquisições multiplanares, com técnicas ponderadas em T1 e T2, nos planos axial, coronal e sagital, sem a injeção do meio de contraste paramagnetico

Análise:

[crops verte de lombares alimhados posteriormente.]

[Artic lações at trapolacina esta integras.

[Artic lações at trapolacina esta interesta amplos.

[Sinalacide di la patie des relativa no nível L5-S1 caracterizada por redução na altura do disco.

[Sinalacide di la patie des relativa no nível L5-S1 caracterizada por redução na altura do disco.]

Protrusão discal de baye larga toraminal equerda em L4-L5 que não determina repercussão significativa sobre as esti que al neurals.

Abaulamento difuso do osce 255° com rotre posterior e paramediana esquerda exibindo migração subligamento superior en perce de 0.5cm, onde observa-se tissura concentrica de fibras do anel turoso determinanto compressão da face anterolateral correspondente do saco dural e raiz desperiente de 0.5cm, onde observa-se tissura correspondente do saco dural e raiz desperiente de 0.5cm, onde observa-se tissura correspondente do saco dural e raiz desperiente de 0.5cm, onde observa-se tissura correspondente do saco dural e raiz desperiente de 0.5cm, onde observa-se tissura correspondente do saco dural e raiz desperiente de 0.5cm, onde observa-se tissura correspondente do saco dural e raiz desperiente de 0.5cm, onde observa-se tissura correspondente do saco dural e raiz desperiente de 0.5cm, onde observa-se tissura correspondente do saco dural e raiz desperiente de 0.5cm, onde observa-se tissura correspondente do saco dural e raiz desperiente de 0.5cm, onde observa-se tissura correspondente do saco dural e raiz desperiente de 0.5cm, onde observa-se tissura correspondente do saco dural e raiz desperiente de 0.5cm, onde observa-se tissura correspondente do saco dural e raiz desperiente de 0.5cm, onde observa-se tissura correspondente do saco dural e raiz desperiente de 0.5cm, onde observa-se tissura correspondente do saco dural e raiz desperiente de 0.5cm, onde observa-se tissura correspondente do saco dural e raiz desperiente de 0.5cm, onde observa-se tissura correspondente do configuração concentra-se de configuração da face anterolateral correspondente do configuração anatômica.

spondilodiscopatia degenerativa lombar

Protrusão discal de base larga foraminal esquerda em L4-L5 que não det (m) a repercussão

significativa sobre as estruturas neurals.

Abaulamento difuso do disco L5-S1 com protrusão focal posterior e paramediar a esquinda explando migração subligamentar superior, onde observa-se fissura concentrica de fibras oculos fibroso, determinando compressão da face anterolateral correspondente do saco dural e raiz fibroso, determinando compressão da face anterolateral correspondente do saco dural e raiz fibroso. Demais aspectos acima relatados.

NOTA: Exame documentado em 03 filmes (LASER) 35 x 43cm e 02 papeis fotográficos

Dra) JULIANA DA CUNHA COSTA CAVALCANTE
CRM 10963-60

exame de diagnostico por imagum depende da análise conjunta do seu resultado o dados dinigo

Tel: (62) 3239-3839 / 3224-2743